


とうがいこつ 頭蓋骨





図 6-2 頭蓋の脳頭蓋と顔面頭蓋

頭蓋は脳頭蓋と顔面頭蓋とに分けられる。顔面頭蓋の口蓋骨と下鼻甲介はこの方向からは見えない。数字は骨の数を示す。




カラー人体解剖学 p 103

ないぞうとうがい がんめんとうがい 内臓頭蓋 = 顔面頭蓋




るいこつ
涙骨



るいのうこう
涙嚢溝

るいのう か
涙嚢窩

びこつ
鼻骨



しこつこう
篩骨溝



じょこつ
鋤骨



じょこつよく
鋤骨翼



じょうがくこつ
上顎骨



ぜんとうとつ き
前頭突起


じょうがくこつたい
上顎骨体


きょうこつとつ き
頬骨突起



こうがいとつ き
口蓋突起

じょうがくどう
上顎洞







口唇裂

口蓋裂

- ・口唇裂・口蓋裂の乳児では母乳を吸えない
- ・日本人では500人に1人の割合で生じ、日本人に多い先天異常といわれる
- ・原因は妊娠初期に胎児に異常な力が加わったり、母体の栄養障害や鎮痛薬など形態異常を誘発する薬を使ったり、風疹にかかったり、放射線照射を受けることなどが要因としてあげられる。遺伝や高齢出産も原因といわれるが7割は原因不明








図 6-2 頭蓋の脳頭蓋と顔面頭蓋

頭蓋は脳頭蓋と顔面頭蓋とに分けられる。顔面頭蓋の口蓋骨と下鼻甲介はこの方向からは見えない。数字は骨の数を示す。




カラー人体解剖学 p 1 0 3


しんけいとうがい のうとうがい
神経頭蓋 = 脳頭蓋



『矢』は直線的に飛ぶ




カラー人体解剖学 p 1 0




カラー人体解剖学 p 1 0 4

図 6-18 新生児の頭蓋


新生児の頭蓋には泉門がある。泉門によって頭蓋は拡張することができ、出生時に頭蓋が変形する。2～4歳頃までに泉門は消失し、頭蓋の発達完成する。



カラー人体解剖学 p 1 2 5






3 頭蓋の発達




子供の顔面
頭蓋は小さい
ので顔は丸く見える





側頭骨、鱗部
Temporal bone, squamous part

「側頭骨の鱗部」とは、頭蓋骨の側面に
ある側頭骨のうち、扁平で薄い部分



側頭骨、錐体部
Temporal bone, Petrous part

「側頭骨の錐体部」は、側頭骨の中で内耳（聴覚・平衡感覚の器官）を含む、非常に硬くて密な部分






図8-51



系統看護学講座専門基礎解剖生理学第10版p447

26



つち骨

きぬた骨

あぶみ骨



鎚

つち

ツチ(槌)骨は形がハンマーの形をしていること



砧

きぬた

キヌタ(砧)は槌で布を打つ台のこと

鐙

あぶみ

アブミは馬具の鐙

