

疾病論3

No. [REDACTED]

日南看護専門学校 令和6年度 試験問題 (循環器:大窪先生)

1) 12誘導心電図の装着時, 前胸部誘導の取り付け順(胸骨右縁→左中腋窩線にかけて)で正しいものはどれか.

- a. 赤→黄→緑→茶→黒→紫
- b. 赤→緑→黄→黒→茶→紫
- c. 緑→黄→赤→茶→黒→紫
- d. 紫→黄→緑→茶→黒→赤


2) 正しい組み合わせを一つ選べ.

- a. 胸水 - 左心不全
- b. 肺水腫 - 右心不全
- c. 下腿浮腫 - 右心不全
- d. 頸静脈怒張 - 左心不全

3) あなたが病棟で心不全患者さんを受け持っているとして, 誤った発言はどれか.

- a. 塩分は1日7g以下を目標にしましょう.
- b. 水分を摂取しすぎないようにしましょう.
- c. 息が苦しくなったら, まずは足を挙上しましょう.
- d. 薬を飲み忘れないようにしましょう.

4) 下記の心電図所見はどれか.



- a. 発作性上室性頻拍
- b. 心室細動
- c. 心房細動
- d. 心室頻拍

5) 直ちに除細動が必要な不整脈はどれか。

- a. 心室細動
- b. 洞不全症候群
- c. 慢性心房細動
- d. 完全房室ブロック

6) 狭心症発作時に使用するのはどれか

- a. アスピリン
- b. ジギタリス
- c. ニトログリセリン
- d. リン酸コデイン

7) 肺血栓塞栓症に関して、誤りを一つ選べ。

- a. 経口避妊薬が原因になり得る。
- b. 妊娠中に発症することがある。
- c. 閉塞性動脈硬化症が原因になることがある。
- d. 悪性腫瘍が原因になることがある。

8) 左心不全の徴候でないのはどれか。

- a. 呼吸困難
- b. 起座呼吸
- c. 浮腫
- d. 咳

9) 狭心症の症状として誤っているのはどれか

- a. 締め付けられる胸の痛み
- b. 冷汗
- c. 左肩の痛み
- d. 吸気時の痛み

10) 急性大動脈解離に対する治療として、最も必要性の低いものはどれか。

- a. 厳密な降圧管理
- b. 鎮痛薬での疼痛管理
- c. 人工血管置換術
- d. 厳重な血糖のコントロール

11) - 12)

67 歳女性. 2 ヶ月前から下腿浮腫を自覚していた. 昨晚, 就寝後に呼吸苦が出現し, 横になることが出来ず座って 1 晩を過ごした. 翌日病院を受診し, 僧帽弁逆流症によるうっ血性心不全と診断された. 来院時血圧 110/65mmHg, 脈拍 110 回/分, 体温 36.7°C, SpO2 89%.

11) 最初に行う対処として, 誤りはどれか.

- a. 酸素吸入
- b. 利尿剤の投与
- ☒ c. 細胞外液の輸液
- d. 血管拡張薬の投与

12) 入院後の管理として, 最も必要度の低いものはどれか.

- a. SpO2 モニターの装着
- ☒ b. 下肢の挙上
- c. 尿量測定
- d. 下腿浮腫の観察

13) 心臓弁膜症の診断に有用でないものはどれか.

- ☒ a. ホルター心電図
- b. 心臓超音波検査
- c. 聴診
- d. 心臓カテーテル検査

14) 心タンポナーデの徴候として誤っているのはどれか。

- a. 血圧低下
- b. 頸静脈怒張
- ☒ c. 静脈圧低下
- d. 心音微弱

15) 組み合わせで正しいものはどれか.

- a. 心室性期外収縮 - 脳梗塞
- b. 狭心症 - 高 HDL 血症
- c. 拡張型心筋症 - 失神発作
- ☒ d. 感染性心内膜炎 - 抜歯

16. 刺激伝導系に関して図示してください。

17. 冠動脈の解剖を図示してください。


18. 心臓およびその周囲の解剖について、図示してください。

No. [REDACTED] 0

1) ~15) には、a~d の中で当てはまるものを記入してください。


1)	a	2)	c	3)	c	4)	c	5)	a
6)	c	7)	c	8)	c	9)	d	10)	d
11)	c	12)	b	13)	a	14)	c	15)	d

16. 刺激伝導系に関して図示してください。



10 //

18. 心臓およびその周囲の解剖について、図示してください。



20 //

Good!

日南看護専門学校 令和5年度 試験問題

1) ワルファリンカリウム服用時に避けたほうがよい食品はどれか。

- ☒ a. 納豆
- b. チーズ
- c. 緑茶
- d. グレープフルーツ


2) 正しい組み合わせを一つ選べ。

- ☒ a. 胸水 - 左心不全
- b. 肺水腫 - 右心不全
- ☒ c. 下腿浮腫 - 右心不全
- d. 頸静脈怒張 - 左心不全

3) あなたが病棟で心不全患者さんを受け持っているとして、誤った発言はどれか。

- a. 塩分は1日7g以下を目標にしましょう。
- ☒ b. 水分を摂取しすぎないようにしましょう。
- ☒ c. 息が苦しくなったら、まずは足を挙上しましょう。
- d. 薬を飲み忘れないようにしましょう。

4) 下記の心電図所見はどれか。



- a. 発作性上室性頻拍
- ☒ b. 心室細動
- ☒ c. 心房細動
- d. 心室頻拍

5) 直ちに除細動が必要な不整脈はどれか。

- ☒ a. 心室細動
- b. 洞不全症候群
- c. 慢性心房細動
- d. 完全房室ブロック

6) 狭心症発作時に使用するのはどれか

- a. アスピリン
- b. ジギタリス
- ☒ c. ニトログリセリン
- d. リン酸コデイン

✓ 7) ショックの進行予防に頭側の軽度挙上が有効なのはどれか。

- ☒ a. 出血性ショック
- b. 心原性ショック
- ☒ c. 敗血症性ショック
- d. アナフィラキシーショック

8) 左心不全の徴候でないのはどれか。

- ☒ a. 呼吸困難
- ☒ b. 起座呼吸
- ☒ c. 浮腫
- d. 咳

9) 狭心症の症状として誤っているのはどれか

- a. 締め付けられる胸の痛み
- b. 冷汗
- c. 左肩の痛み
- ☒ d. 吸気時の痛み

10) 急性大動脈解離に対する治療として、最も必要性の低いものはどれか。

- a. 厳密な降圧管理
- b. 鎮痛薬での疼痛管理
- c. 人工血管置換術
- ☒ d. 厳重な血糖のコントロール

11) - 12)

67 歳女性. 2 ヶ月前から下腿浮腫を自覚していた. 昨晚, 就寝後に呼吸苦が出現し, 横になることが出来ず座って 1 晩を過ごした. 翌日病院を受診し, 僧帽弁逆流症によるうっ血性心不全と診断された. 来院時血圧 110/65mmHg, 脈拍 110 回/分, 体温 36.7°C, SpO₂ 89%.

11) 最初に行う対処として, 誤りはどれか.

- a. 酸素吸入
- b. 利尿剤の投与
- ☒ c. 細胞外液の輸液
- d. 血管拡張薬の投与

12) 入院後の管理として, 最も必要度の低いものはどれか.

- a. SpO₂ モニターの装着
- ☒ b. 下肢の挙上
- c. 尿量測定
- d. 下腿浮腫の観察

13) 心臓弁膜症の診断に有用でないものはどれか.

- ☒ a. ホルター心電図
- b. 心臓超音波検査
- c. 聴診
- d. 心臓カテーテル検査

14) チアノーゼの際に増加しているのはどれか.

- a. 直接ビリルビン
- b. 間接ビリルビン
- c. 還元ヘモグロビン → O₂
- ☒ d. 酸化ヘモグロビン

15) 組み合わせで正しいものはどれか.


- a. 心室性期外収縮 - 脳梗塞
- b. 狭心症 - 高 HDL 血症
- c. 拡張型心筋症 - 失神発作
- ☒ d. 感染性心内膜炎 - 抜歯

No.


1) ~15) には、a~d の中で当てはまるものを記入してください。

1) a	2) c	3) c	4) c	5) a
6) c	7) b	8) c	9) d	10) d
11) c	12) b	13) a	14) d c	15) d


16. 刺激伝導系に関して図示してください。




17. 冠動脈の解剖を図示してください。



18. 心臓およびその周囲の解剖について、図示してください。



18. 心臓およびその周囲の解剖について、図示してください。



30
227+