

Q1, 成人の正常尿で正しいのはどれか。1つ選べ。

- ① 1日尿量は400mlである。
- ② 排尿直後は無色である。
- ③ 尿比重が1.025である。
- ④ 排尿直後にアンモニア臭がある。

Q2, 尿潜血反応が陽性の時、尿中に存在するのはどれか。1つ選べ。

- ① ウロビリノーゲン。
- ② ヘモグロビン。
- ③ アルブミン。
- ④ ビリルビン。

Q3, 腹圧性尿失禁の原因はどれか。1つ選べ。

- ① 骨盤底筋群の筋力低下。
- ② 膀胱感染。
- ③ 脳血管障害。
- ④ 脊髄損傷。

Q4, 前立腺肥大症での尿失禁のタイプはどれか。1つ選べ。

- ① 溢流性尿失禁。
- ② 切迫性尿失禁。
- ③ 腹圧性尿失禁。
- ④ 機能性尿失禁。

Q5,Aさん(73歳、女性)は、既往歴はなく自立した生活を送っていた。最近、尿意を我慢できず尿失禁することがあり、夜間の排尿回数も増えたため、病院を受診した。その結果、過活動膀胱と診断された。Aさんへの看護師の指導内容で適切なのはどれか。1つ選べ。

- ①腹筋を鍛える。
- ②尿意を感じたらすぐにトイレに行く。
- ③水分摂取を控える。
- ④膀胱訓練を行う。

Q6,腎盂腎炎について正しいのはどれか。1つ選べ。

- ①両側性である。
- ②初尿を用いて細菌検査を行う。
- ③原因はグラム陽性球菌が多い。
- ④肋骨脊柱角の叩打痛が特徴である。

Q7, 排尿時に収縮するのはどれか。①つ選べ。

- ①尿管。
- ②尿道。
- ③膀胱平滑筋。
- ④内尿道括約筋。
- ⑤外尿道括約筋。

Q8,午前9時に経静脈性腎盂造影を受ける予定の25歳の女性患者が直前に次の様に述べた。検査を延期すべきなのはどれか。1つ選べ。

- ①最終月経開始から10日である。
- ②2日前に造影CT検査を受けた。
- ③今朝8時に朝食を食べた。

④ 昨晚、腹痛のため鎮痛剤を使用した。

⑤ 内服薬は有効である。

Q9, 膀胱鏡検査時の看護で誤っているのはどれか。1 つ選べ。

- ① 患者を検査台に乗せて碎石位を取らせる。
- ② 尿道口を消毒後、男性は尿道麻酔を行う。
- ③ 検査後は水分を十分摂取させ、排尿を促す。
- ④ 機械挿入時は腹式呼吸をさせ、腹部に力を入れる。

Q10, 膀胱鏡検査で適切なものはどれか。1 つ選べ。

- ① 検査後は十分な水分摂取を促す。
- ② 検査時は腹筋を緊張させるように説明する。
- ③ 検査後は膀胱内留置カテーテルを挿入する。
- ④ 検査時の体位は骨盤高位である。

Q11, 膀胱で正しいのはどれか。1 つ選べ。

- ① 漿膜で覆われている。
- ② 直腸の後方に存在する。
- ③ 粘膜は移行上皮である。
- ④ 筋層は2層構造である。

Q12, 下部尿路症状のうち畜尿症状はどれか。2 つ選べ。

(3点) 完答

- ① 尿線途絶。
- ② 残尿感。
- ③ 腹圧排尿。
- ④ 尿失禁。
- ⑤ 尿意切迫感。

Q13,切迫性尿失禁で誤っているのはどれか。1つ選べ。

- ①膀胱内圧測定で無抑制収縮を認める。
- ②尿意がなく、失禁する。
- ③抗コリン薬を治療に用いる。
- ④徐々に排尿間隔を延ばすよう指導する。

Q14,尿失禁の種類と対応の組み合わせで正しいのはどれか。1つ選べ。

- ①溢流性尿失禁：排尿間隔の記録
- ②機能性尿失禁：骨盤底筋体操
- ③反射性尿失禁：間欠的自己導尿
- ④切迫性尿失禁：下腹部への軽い刺激

Q15,前立腺肥大症の術後排尿障害に対する看護で適切なのはどれか。2つ選べ。 (2点) 完答

- ①尿量は1日1Lを確保する。
- ②一定時間ごとの排尿を勧める。
- ③積極的に運動を行う。
- ④肛門括約筋収縮の練習を指導する。

Q16,尿管結石症の治療で適切なのはどれか。2つ選べ。 (3点) 完答

- ①非ステロイド系抗炎症薬の投与。
- ②血管拡張薬の投与。
- ③体外衝撃波碎石術(ESWL)。
- ④カルシウム製剤の投与。
- ⑤尿路変更術。

Q17,前立腺癌について正しいのはどれか。1つ選べ。

- ①骨への転移は稀である。

② α 交感神経遮断薬が有効である。

③ 内分泌療法は無効である。

④ 血清 PSA 値が上昇する。

Q18, 過活動膀胱の説明で正しいのはどれか。1 つ選べ。

① 水分を制限して治療する。

② 失禁することはない。

③ 尿意切迫感がある。

④ 50 歳代の有病率が最も高い。

Q19, 膀胱癌について正しいのはどれか。1 つ選べ。

① 女性に多い。

② 経尿道的生検によって治療法を決定する。

③ 尿路上皮癌より腺癌が多い。

④ 表在性の癌に対して膀胱全摘除術が行われる。

Q20, 経尿道的な前立腺切除術後 1 日の患者。尿流出は順調であるにも関わらず「尿が出ない」と膀胱留置カテーテルの違和感を強く訴えた。対応で適切なのはどれか。1 つ選べ。

① 持続膀胱洗浄の速度を速める。

② 鎮痛薬を使用する。

③ 膀胱留置カテーテルを抜去する。

④ 細い膀胱留置カテーテルに入れ替える。

疾病論 4 (泌尿器: 宮元先生)

R 6. 10. 31 (木) 実施

試験解答用紙

番号 ()

氏名 ()

25

Q1	③	Q11	②
Q2	②	Q12	④ ⑤
Q3	①	Q13	②
Q4	①	Q14	③
Q5	④	Q15	② ④
Q6	④	Q16	① ③
Q7	③	Q17	④
Q8	③	Q18	③
Q9	④	Q19	②
Q10	①	Q20	②